



## WIE KAN AAN HET BEVOLKINGSONDERZOEK MEEDOEN

Het bevolkingsonderzoek is bestemd voor vrouwen van de 25 t/m 65 jaar. Vrouwen die ouder dan 65 jaar zijn en meer dan 10 jaar geleden een PAP-test hebben gedaan.

## WIE KAN NIET MEEDOEN AAN HET BEVOLKINGSONDERZOEK

Vrouwen die geen baarmoeder en baarmoedermond hebben. Vrouwen die in verwachting zijn tot 3 maanden na de bevalling. Vrouwen die onder behandeling zijn bij de gynaecoloog. Vrouwen die minder dan 3 jaar geleden een HPV-test hebben gedaan.

## BELANGRIJKE TIPS OP DE DAG VAN DE SCREENING

Geen vaginale ovule of vaginale douches gebruiken. Vrouwen die op de dag van de screening menstrueren moeten hun afspraak verzetten. Advies: Onthouding van seksuele gemeenschap 3 dagen voor de screening.

## WAT KOST DE TEST

De screening is vrij van kosten voor alle vrouwen uit de doelgroep die op Curaçao staan ingeschreven.

## VOOR MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over het bevolkingsonderzoek kunt u contact opnemen met Fundashon Prevensionh.

Voor een afspraak kunt u bij uw huisarts terecht of tijdens kantooruren bellen of langskomen bij het hoofdkantoor van Fundashon Prevensionh te Rialtostraat 2-4, Molenplein (Otrobanda).

Fundashon Prevensionh heeft meerdere locaties waar de HPV screening gedaan kan worden: Otrobanda, Sambil, Sentro Médiko Sorsaka, Sentro Médiko Aesculapius en Tera Kòrà.

**Fundashon Prevensionh biedt gratis vervoer van en naar een van onze locaties.**



*fundashon* prevensionh

## FUNDASHON PREVENSHON

Rialtostraat 2-4, Molenplein  
Willemstad, Curaçao

T: 462-3380 | 0800-1811 (gratis)

F: 465-3390

E: [info@fundashonprevensionh.com](mailto:info@fundashonprevensionh.com)

[www.fundashonprevensionh.com](http://www.fundashonprevensionh.com)



FundashonPrevensionh

## BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER



## HOE ONTSTAAT BAARMOEDERHALS KANKER

## WAAROM EEN BEVOLKINGSONDERZOEK

Het doel van het bevolkingsonderzoek is om het voorstadium van baarmoederhalskanker tijdig op te sporen. In juni 2016 is het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker gestart om de preventie op Curaçao te stimuleren. Baarmoederhalskanker is de tweede meest voorkomende kankersoort bij vrouwen in het Caraïbisch gebied en de vierde kankersoort bij vrouwen op Curaçao. Er worden jaarlijks wereldwijd 500.000 nieuwe gevallen ontdekt. In verschillende landen hebben screeningsprogramma's aangetoond dat het aantal gevallen door de screening verlaagd is. Het doel is om zo veel mogelijk vrouwen tussen 25 en 65 jaar te screenen.



**25-29 jaar oud**

Alleen een PAP-test.



**30-65 jaar oud**

HPV-test. Bij een positieve HPV-test wordt een PAP-test gedaan.

Baarmoederhalskanker ontstaat door een infectie met het HPV virus. HPV staat voor Humaan Papilloom Virus. Het virus wordt overgedragen door seksueel contact. Meer dan 80% van vrouwen wordt tenminste een keer in haar leven besmet met dit virus. Het lichaam ruimt het virus in meeste gevallen op binnen 1 1/2 tot 2 jaar. In 3-4% van de gevallen, lukt het lichaam het virus niet kwijt te raken. Dit kan leiden tot afwijkende cellen van de baarmoedermond, het voorstadium van baarmoederhalskanker. Na lange tijd kunnen de de cellen zich langzaam tot baarmoederhalskanker ontwikkelen.

## WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN DE HPV-TEST EN PAP-TEST

De HPV-test bepaalt de aanwezigheid van het HPV virus. Bij de PAP-test wordt gekeken of er afwijkingen zijn in de cellen van de baarmoedermond. Vrouwen tussen de 25 en 29 jaar krijgen alleen een PAP-test. Bij vrouwen tussen de 30 en 65 jaar wordt een HPV-test gedaan. Bij een positieve HPV-test wordt ook een PAP-test gedaan uit hetzelfde monster.

## HOE WORDT DE TEST GEDAAN

U wordt gevraagd om het onderlichaam te ontbloten en op de onderzoekstafel plaats te nemen. Daarna wordt de spreider in de vagina geplaatst. Zo wordt de baarmoedermond zichtbaar. Er wordt met een heel klein borsteltje, materiaal uit de baarmoederhalskanaal genomen. Vervolgens wordt het monster in het laboratorium beoordeeld.

## WAAROM IS HET BELANGRIJK OM MEE TE DOEN AAN HET BEVOLKINGSONDERZOEK

Door u te laten screenen is er kans dat het voorstadium van de baarmoederhalskanker op tijd wordt ontdekt. Hierdoor is een grotere kans dat de behandeling minder zwaar is en meer succes heeft.